

NAVODILA ZA OBRAVNAVO OSEBE S SUMOM NA OKUŽBO S SARS- CoV-2 V DOMOVIH ZA STAREJŠE, POSEBNIH ZAVODIH ZA ODRASLE, DOMSKEM VARSTVU VARSTVENO DELOVNIH CENTROV, ZAVODIH ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI IN DOMOVIH ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI

Namen navodil je zagotoviti enoten pristop pri obravnavi oseb s sumom na okužbo z virusom SARS – CoV-2 v ustanovah, kjer domujejo ali se zadržujejo osebe, ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov imunsko oslabiljeni in za katere okužba z virusom SARS-CoV-2 predstavlja večje tveganje. Te ustanove vključujejo domove za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri (domsko varstvo), zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovi za učence s posebnimi potrebami.

Bolezen dihal COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 se širi po vsem svetu, primeri so se pojavili tudi v Sloveniji.

Za preprečevanje širjenja okužb pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je zelo pomembno, da čimprej prepoznamo bolnika s sumom na okužbo ter ga obravnavamo v skladu z navodili, tako da preprečimo prenos na druge uporabnike in hkrati zaščitimo zdravstvene delavce in drugo zaposleno osebje.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo redno spremljati navodila pristojnih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem navodilu: MZ)), kako ukrepati v primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin.

Če se sum na okužbo pojavi pri zaposlenemu, naj postopa po ustaljenem protokolu za splošno populacijo:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ukom_sum_na_okuzbo_koronavirus_protokol_za_drzavljanec.jpg

Vedno kadar se pri uporabniku pojavi sum na COVID-19, naj se pristojni zdravstveni delavec ali druga pristojna oseba takoj obrne na izbranega* ali dežurnega zdravnika. Hitro odkrivanje, triaža in izolacija bolnika z zelo nalezljivo boleznijo COVID-19 je bistvenega pomena za preprečevanje širjenja in nepotrebnega izpostavljanja drugih uporabnikov in osebja.

Ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 so enaki ukrepom, ki jih ti izvajalci zdravstvene dejavnosti izvajajo vsak dan za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja drugih respiratornih virusov, kot na primer gripa.

Pojav morebitnih simptomov in znakov okužbe dihal, ki so značilni za COVID-19 je potrebno spremljati stalno, posebno pozornost je potrebno posvetiti uporabniku, **ki se je vrnil z obiska pri svojcih, ki je bil na novo sprejet ali pa se je vrnil iz bolnišnice.**

OBRAVNAVA SUMA NA COVID-19 pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Najbolj značilni simptomi okužbe dihal, pri katerih posumimo na COVID-19 so naslednji: **vročina, kašelj, težko dihanje.**

Ko pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti posumijo, da se je pri enem ali več uporabnikih pojavil sum na bolezen COVID-19, morajo o tem takoj obvestiti izbranega* ali dežurnega zdravnika.

Bolnika do prihoda zdravnika namestimo v prostor z zaprtimi vrati, ločeno od ostalih uporabnikov.

Bolnika prosimo, da si nadene navadno zaščitno masko na elastiko (kirurško masko), če tega ne zmore sam, mu masko nadane zdravstveni delavec, ki se mora zaščiti z masko IIR z vizirjem (s trakci), vodoodpornim plaščem in rokavicami za enkratno rabo.

Izbrani ali dežurni zdravnik, ki je bil obveščen o sumu na bolnika s COVID-19, bolnika pregleda in po presoji uredi odvoz brisa, tako da:

- a) uporabnika z rešilnim vozilom napoti na odvoz kužnin (brisa) na eno od 16 lokacij po navodilih MZ,
- b) ali bris odvzame zaposlen iz vstopne točke za odvoz kužnin.

Pred prevozom in premestitvijo morajo biti uslužbenci nujne medicinske službe in sprejemni center obveščeni o sumu na COVID-19, da se ustrezno zaščitijo.

V začetni fazi bodo vsi primeri s potrjeno diagnozo COVID-19 napoteni v bolnišnico.

Kasneje bo zdravnik glede na resnost bolezenskih znakov odločal ali bo uporabnik s potrjeno okužbo ostal v ustanovi, odšel domov, oziroma bo napoten na zdravljenje v bolnišnico.

Bolnik bo lahko ostal v ustanovi, če bodo bivalni pogoji v ustanovi primerni – možnost izolacije in primerna zdravstvena oskrba. O tem se ustanova posvetuje z epidemiologom. Pri zdravstveni negi in oskrbi bolnika s potrjeno okužbo, morajo zaposleni izvajati standardno, kapljično in kontaktno izolacijo.

Podrobna navodila:

<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/SmerniceNAKOBO-za-strokovnjake.pdf>

Izbrani ali dežurni zdravnik mora o vsakem potrjenem primeru COVID-19 obvestiti epidemiološko službo.

Epidemiolog v sodelovanju s pristojnim zdravstvenim delavcem v ustanovi pripravi seznam vseh oseb, (uporabnikov in osebja - kontakti) s katerimi je bil bolnik v stiku od začetka pojava bolezenskih znakov do namestitve v izolacijo oziroma odhoda v bolnišnico .

Epidemiolog glede na vrsto stika tesnim kontaktom odredi ukrep (samo izolacija, omejitev gibanja ali kohortna samo izolacija v ločenem delu stavbe).

****izbrani zdravnik - zdravnik, ki je zadolžen za zdravstveno oskrbo uporabnikov***

Priloge:

Navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2

<https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>

Osebna varovalna oprema;

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/tehnichni_dokument_osebna_varovalna_oprema_splet.pdf

Navodila za obiskovalce;

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_obiskovalci_dso_0.pdf

Navodila za preprečevanje akutnih okužb dihal za zaposlene v domovih za starejše (DSO) in drugih socialnovarstvenih zavodov (SVZ);

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_zaposleni_dso_0.pdf

Seznam kontaktov;

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-epidemiologi#seznam-kontaktov>

ALGORITEM OBRAVNAVE SUMA NA COVID-19

A Simptomi okužbe dihal pri katerih posumimo na COVID-19 :
vročina,
kašelj,
težko dihanje



B obvestimo izbranega ali dežurnega zdravnika,
bolnika do prihoda zdravnika ločimo od ostalih uporabnikov,
zdravstveni delavec se zaščiti z masko IIR z vizirjem (s trakci),
vodoodpornim plaščem in rokavicami za enkratno rabo in bolniku
namesti kirurško masko.



C izbrani ali dežurni zdravnik bolnika pregleda,
po presoji uredi odvzem brisa,
bolnika napoti v bolnišnico ali bolnik ostane v oskrbi v ustanovi ali
gre domov,
obvesti epidemiologa,
epidemiolog poišče bolnikove tesne kontakt in jim odredi ukrepe.