

KDAJ LAHKO VZGOJITELJ ODKLONI OTROKA ZA SPREJEM IN STARŠE Z NJIM NAPOTI K ZDRAVNIKU?

Kadar ima otrok navedene znake:

- Vročino, neobičajno utrujenost, razdražljivost, težko diha, gnojni izcedek iz nosu, neprestano joka ali kaže druge znake bolezni,
- ima drisko ali bruha (2 ali večkrat v 10 urah) in ni mogoče iz podatkov ali opazovanja izključiti črevesne okužbe,
- ima razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik meni, da ni infekcijske narave,
- ima izpuščaj z vročino ali spremembami vedenja, dokler zdravnik ne izključi nalezljivosti,
- ima gnojno vnetje očesnih veznic (konjunktivitis), dokler zdravnik ne dovoli obiskovanja vrtca (po prenehanju kliničnih znakov),
- ima gnojne spremembe na koži (impetigo), dokler ne preteče vsaj 24 ur od začetka zdravljenja,
- ima uši, do naslednjega dne po depedikulaciji,
- ima srbeč izpuščaj, ki so lahko garje, do zaključnega zdravljenja,
- kašlja v napadih z zariplotjo, dokler zdravnik ne oceni, da ni kužen,
- ima otekline obušesnih žlez slinavk, dokler zdravnik ne oceni, da ni kužen.

Začasna izključitev je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja bolezni med otroci.